



**Kills Bed Bugs, Cockroaches
And Other Insects**

Manufactured By:



sujanil chem industries

P.O.Box No. 1451, Market Yard, Pune-411037, Maharashtra (India)
Factory: 69, Wanawadi Industrial Area, Kondhwa Road, Pune - 411040, MH
www.sujanil.com

CONSUMER HELPLINE: MANAGER CONSUMER AFFAIRS
Ph.: 020-24270228 • E-mail: sales@sujanil.com

TRANSFLUTHRIN + CYPERMETHRIN (spray)

TRANSFLUTHRIN 1.0% + CYPERMETHRIN 0.25% Household Insecticide Spray is ready to use non propellant spray insecticide for controlling mosquitoes houseflies, cockroaches and ants.
Direction for use: Close all doors and windows before treatment. Keep the room closed for 10 to 15 minutes after spray. **Precautions for use:** Keep away from children and pets. Keep away from temperatures above 50° C and direct sunlight. Avoid excessive inhalation of spray. Do not spray in rooms with an exposed flame and on red hot substance. avoid using on people, animals, birds, aquaria and food products. prevent contact with food, utensils and drinking water. **Symptoms Of Poisoning:** Headache, dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, excessive salivation, fatigue, burning or itching sensation in eyes and skin. **First Aid:** If ingested seek medical advice immediately. In case of skin contamination, wash with plenty of soap and water. If eyes are affected, flush with plenty of water. If pain, irritation or redness exist consult doctor immediately. If inhaled, remove the person from exposure to fresh air. If a person is feeling unwell, seek medical advice.

ENGLISH

ट्रांसप्लुथ्रिन + सायपरमेथ्रिन (स्प्रे)

ट्रांसप्लुथ्रिन 1.0% + सायपरमेथ्रिन 0.25% घरगुती कीटकनाशक स्प्रे डास, घरातील माथ्या, झुरळे आणि मुंग्या नियंत्रित करण्यासाठी तयार वापरण्यायोग्य नॉन-प्रोपेलेंट स्प्रे कीटकनाशक आहे. **वापराच्या सूचना:** उपचारापूर्वी सर्व दरवाजे आणि खिडक्या बंद करा. स्प्रेंंतर खोली 10 ते 15 मिनिटे बंद ठेवा. **वापरासाठी सावधानता:** मुले आणि पाळीव प्राणी यांच्यापासून दूर ठेवा. 50° C पेक्षा जास्त तापमान आणि थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा. स्प्रें जास्त प्रमाणात श्वासात घेणं टाळा. उघड्या ज्योत असलेल्या खोल्यांमध्ये आणि लाल गरम पदार्थावर स्प्रें करू नका. मानव, प्राणी, पक्षी, मत्स्यालय आणि खाद्य उत्पादनांवर वापरणे टाळा. अन्न, भांडी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या संपर्कात येऊ नये. **विषबाधाची लक्षणे:** डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ, उलट्या, अतिसार, जास्त लाळ येणे, थकवा, डोळे आणि त्वचेत जळजळ किंवा खाज येणे. **प्रथमोपचार:** जर गिळले तर त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. त्वचेला दूषित झाल्यास, भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. डोळे प्रभावित झाल्यास, भरपूर पाण्याने धुवा. वेदना, जळजळ किंवा लालसरपणा असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. श्वास घेतल्यास, व्यक्तीला एक्सपोजरमधून ताजी हवेत घेऊन जा. जर एखाद्या व्यक्तीला अस्वस्थ वाटत असेल, तर वैद्यकीय सल्ला घ्या.

MARATHI

ट्रांसप्लुथ्रिन + साइपरमेथ्रिन (स्प्रे)

ट्रांसप्लुथ्रिन 1.0% + साइपरमेथ्रिन 0.25% घरेलू कीटनाशक स्प्रें मच्छरां, घरेलू मक्खियां, तिलचट्टां और चींटियों को नियंत्रित करने के लिए तैयार उपयोग किया जाने वाला गैर-प्रोपेलेंट स्प्रें कीटनाशक है। **उपयोग के लिए निर्देश:** उपचार से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करें। स्प्रें के बाद कमरे को 10 से 15 मिनट तक बंद रखें। **उपयोग के लिए सावधानियां:** बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। 50° C से अधिक तापमान और सीधी धूप से दूर रखें। स्प्रें के अत्यधिक साँस लेने से बचें। खुले लौ वाले कमरों में और लाल गर्म पदार्थ पर स्प्रें न करें। मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों, एक्वैरियम और खाद्य उत्पादों पर उपयोग करने से बचें। भोजन, बर्तनों और पीने के पानी के संपर्क से बचाएं। **विषाक्तता के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, उल्टी, दस्त, अत्यधिक लार, थकान, आंखों और त्वचा में जलन या खुजली। **प्राथमिक चिकित्सा:** यदि निगल लिया जाए तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। त्वचा के दूषित होने की स्थिति में, बहुत साबुन और पानी से धो लें। यदि आंखें प्रभावित हों, तो बहुत पानी से धो लें। यदि दर्द, जलन या लाली मौजूद है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि साँस ली जाती है, तो व्यक्ति को एक्सपोजर से ताजी हवा में ले जाएं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो चिकित्सा सलाह लें।

HINDI

BANGLA